

**Théorème : Propriété page 257 du manuel**

Soient  $A$  et  $B$  deux points fixés. L'ensemble des points  $M(x; y)$  du plan tel que  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$  est le cercle de diamètre  $[AB]$ .

*Démonstration.* Votre manuel propose une démonstration de cette propriété, mais c'est une démonstration « calculatoire » : on fait un gros calcul, en comprenant à moitié seulement pourquoi on le fait, et on ne sait pas trop comment on est arrivé au résultat final. Je vous propose une démonstration à l'aide des produits scalaires, sans aucun calcul.

Soit  $A$  et  $B$  deux points distincts, et  $M$  un point du plan. Deux cas sont alors possibles :

1. Le point  $M$  est un des deux points  $A$  ou  $B$ . Alors  $M$  est sur le cercle de diamètre  $[AB]$ , et  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$  (car l'un des deux vecteurs  $\overrightarrow{AM}$  ou  $\overrightarrow{BM}$  est nul).
2. Le point  $M$  n'est pas un des deux points  $A$  ou  $B$ . Alors  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$  si et seulement si les vecteurs  $\overrightarrow{AM}$  et  $\overrightarrow{BM}$  sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si les droites  $(AM)$  et  $(BM)$  sont perpendiculaires.

Or un point (distinct) de  $A$  est  $B$  est sur le cercle de diamètre  $[AB]$  si et seulement si les droites  $(AM)$  et  $(BM)$  sont perpendiculaires, donc le produit scalaire  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM}$  est nul si et seulement si le point  $M$  est sur le cercle de diamètre  $[AB]$ .

Dans les deux cas, le produit scalaire  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM}$  est nul si et seulement si le point  $M$  est sur le cercle de diamètre  $[AB]$ .  $\square$