

*Remarque :*

- l'exercice 2 est un exercice typique de ce qui est attendu de vous ;
- l'exercice 1 va plus loin que ce que je peux exiger de vous : pour celles et ceux qui ont envie de se creuser la cervelle...

**Exercice 1** (Jeu infini). Une kermesse propose le jeu suivant : un joueur lance un dé équilibré à six faces. Si 2, 3, 4, 5 ou 6 est obtenu, il gagne le nombre de bonbons indiqués sur le dé et le jeu s'arrête. Si 1 est obtenu, il gagne un bonbon, et relance le dé pour le même jeu.

Par exemple : une joueuse lance le dé et obtient 1 : elle gagne un bonbon et rejoue. Elle fait à nouveau 1 : elle gagne un second bonbon. Elle relance le dé et obtient 3 : elle gagne trois bonbons et le jeu s'arrête. Elle a gagné au total 5 bonbons.

L'objet de l'exercice est de calculer l'espérance de la variable aléatoire  $X$  associée au nombre de bonbons gagnés à ce jeu. La formule vue en cours ne peut pas être utilisée car le nombre de lancers n'étant pas limité, l'univers est infini.

On fait alors l'hypothèse suivante : sur un 1, plutôt que relancer le dé, on gagne  $1 + E(X)$ , c'est-à-dire 1 plus le gain moyen obtenu sur le second lancer (qui est identique au gain moyen du jeu). Les valeurs prises par la variable aléatoire  $X$  sont alors  $\{1 + E(X), 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

1. Dresser la loi de probabilité de  $X$ .
2. En utilisant la formule de l'espérance vue en cours, montrer que  $E(X) = \frac{21+E(X)}{6}$ .
3. Résoudre l'équation pour déterminer  $E(X)$ .

Pour être rigoureux, avec cette méthode, nous n'avons pas prouvé que  $E(X)$  est égale à la valeur trouvée à la question précédente : nous avons seulement montré que *si l'espérance  $E(X)$  existe*, elle est égale à cette valeur.


4. *Difficile.* Modifier cette expérience aléatoire, ou en inventer une nouvelle, telle que la résolution de l'équation obtenue par la même méthode qu'à la question 2 ne donne pas un résultat correct. Expliquer l'erreur en termes non mathématiques : Quelles caractéristiques de l'expérience aléatoire font que le résultat n'est pas correct ?

**Exercice 2** (QCM). Un exercice est composé de trois questions à choix multiple. Chaque question a quatre propositions de réponses, dont une seule est correcte.

Une réponse correcte rapporte 2 points ; une réponse incorrecte en enlève 1. Un score final négatif est ramené à zéro.

Un élève répond au hasard à ce QCM ; on note  $X$  la variable aléatoire associée au nombre de points gagnés.

1. L'arbre de probabilité ci-contre (dans lequel  $J$  signifie « Réponse juste » et  $F$  signifie « Réponse fausse »), qui décrit l'expérience aléatoire composée de la succession des réponses aux trois questions, est incomplet : il ne décrit que (partiellement) les deux premières questions, et il manque les probabilités.



Recopier et compléter cet arbre : (a) tracer les branches manquantes ; (b) écrire les probabilités ; (c) écrire, pour chaque branche : sa probabilité, le nombre de réponses correctes, et le nombre de points gagnés par l'élève (par exemple, la branche tout en bas devrait être : probabilité :  $1/8$  ; nombre de réponses correctes : 0 ; nombre de points : 0).

2. En utilisant l'arbre de la question précédente, recopier et compléter le tableau suivant, pour déterminer la loi de probabilité de  $X$ .

Réponses correctes	0	1	2	3
Nombre de points				
Probabilité				

3. Calculer l'espérance et la variance de  $X$ .
4. Quelle est la note moyenne qu'obtiendraient un grand nombre de candidats répondant au hasard ?