

Exercice 1 (Lieu géométrique). Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère :

- le cercle \mathcal{C} de centre $A(13; 9)$ et de rayon 6 ;
- la droite \mathcal{D} d'équation $y = 2x - 5$.

On cherche à déterminer les coordonnées des intersections de \mathcal{C} et \mathcal{D} .

1. Soit $M(x; y)$ un point de \mathcal{C} . Déterminer la longueur AM , puis justifier que $(x - 13)^2 + (y - 9)^2 = 36$.

Puisque M est un point du cercle de centre A , alors $[AM]$ est un rayon, donc $AM = 6$.

$$\begin{aligned} AM &= 6 \\ \sqrt{(x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2} &= 6 \\ \sqrt{(x - 13)^2 + (y - 9)^2} &= 6 \\ (x - 13)^2 + (y - 9)^2 &= 6^2 \\ (x - 13)^2 + (y - 9)^2 &= 36 \end{aligned}$$

On considère un point $M(x; y)$ du plan. On admet que ce point est sur le cercle \mathcal{C} si et seulement si l'équation $(x - 13)^2 + (y - 9)^2 = 36$ est vérifiée.

2. Montrer que M est à la fois sur \mathcal{C} et \mathcal{D} si et seulement si :

$$\begin{cases} y = 2x - 5 \\ (x - 13)^2 + (2x - 14)^2 = 36 \end{cases}$$

Le point M est à la fois sur la droite et le cercle si les deux équations sont vérifiées, c'est-à-dire si $y = 2x - 5$ et $(x - 13)^2 + (y - 9)^2 = 36$. Puisque l'équation de la droite est respectée, nous pouvons remplacer le y de l'équation du cercle par $2x - 5$, donc :

$$\begin{cases} y = 2x - 5 \\ (x - 13)^2 + (y - 9)^2 = 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 2x - 5 \\ (x - 13)^2 + (2x - 5 - 9)^2 = 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 2x - 5 \\ (x - 13)^2 + (2x - 14)^2 = 36 \end{cases}$$

3. En déduire que M est à la fois sur \mathcal{C} et \mathcal{D} si et seulement si :

$$\begin{cases} y = 2x - 5 \\ 5x^2 - 82x + 329 = 0 \end{cases}$$

Dans le système d'équation précédent, développons la seconde équation.

$$\begin{aligned} (x - 13)^2 + (2x - 14)^2 &= 36 \\ \iff x^2 - 2 \times x \times 13 + 13^2 + (2x)^2 - 2 \times 2x \times 14 + 14^2 &= 36 \\ \iff x^2 - 26x + 169 + 4x^2 - 56x + 196 - 36 &= 0 \\ \iff 5x^2 - 82x + 329 &= 0 \end{aligned}$$

Donc le point M est sur \mathcal{C} et \mathcal{D} si et seulement si :

$$\begin{cases} y = 2x - 5 \\ 5x^2 - 82x + 329 = 0 \end{cases}$$

4. Résoudre la seconde équation, et en déduire les coordonnées des points d'intersection de \mathcal{C} et \mathcal{D} .

Résolvons cette seconde équation : c'est un trinôme du second degré avec $a = 5$, $b = -82$, $c = 329$. Son discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac = (-82)^2 - 4 \times 5 \times 329 = 144$. Le discriminant est strictement positif, donc il y a deux solutions :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-82) - \sqrt{144}}{2 \times 5} = 7 \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-82) + \sqrt{144}}{2 \times 5} = 9,4 \end{aligned}$$

Nous avons deux valeurs possibles pour x . Utilisons l'équation de la droite pour trouver les valeurs correspondantes pour y .

(a) Si $x = 7$, alors $y = 2 \times 7 - 5 = 9$.

(b) Si $x = 9,4$, alors $y = 2 \times 9,4 - 5 = 13,8$.

Le cercle et la droite ont donc deux points d'intersection, de coordonnées $\begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 9,4 \\ 13,8 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 (Droite et Cercle). *Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère :*

- le nombre réel α ;
- le cercle \mathcal{C} de centre $A(13; 9)$ et de rayon 6 ;
- la droite \mathcal{D} d'équation $y = \alpha x - 4\alpha + 3$.

La droite n'est donc pas « fixe » : elle dépend d'un paramètre α . On cherche à déterminer le nombre de points d'intersections de \mathcal{C} et \mathcal{D} en fonction de ce paramètre α .

1. *Soit $M(x; y)$ un point de \mathcal{C} . Déterminer la longueur AM , puis justifier que $(x - 13)^2 + (y - 9)^2 = 36$.*

Voir la correction de la question 1 de l'exercice 1.

On considère un point $M(x; y)$ du plan. On admet que ce point est sur le cercle \mathcal{C} si et seulement si l'équation $(x - 13)^2 + (y - 9)^2 = 36$ est vérifiée.

2. *Montrer que M est à la fois sur \mathcal{C} et \mathcal{D} si et seulement si :*

$$\begin{cases} y = \alpha x - 4\alpha + 3 \\ (x - 13)^2 + (\alpha x - 4\alpha - 6)^2 = 36 \end{cases}$$

Le point M est à la fois sur la droite et le cercle si les deux équations sont vérifiées, c'est-à-dire si $y = \alpha x - 4\alpha + 3$ et $(x - 13)^2 + (y - 9)^2 = 36$. Puisque l'équation de la droite est respectée, nous pouvons remplacer le y de l'équation du cercle par $\alpha x - 4\alpha + 3$, donc :

$$\begin{cases} y = \alpha x - 4\alpha + 3 \\ (x - 13)^2 + (y - 9)^2 = 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \alpha x - 4\alpha + 3 \\ (x - 13)^2 + (\alpha x - 4\alpha + 3 - 9)^2 = 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \alpha x - 4\alpha + 3 \\ (x - 13)^2 + (\alpha x - 4\alpha - 6)^2 = 36 \end{cases}$$

3. *En déduire que M est à la fois sur \mathcal{C} et \mathcal{D} si et seulement si :*

$$\begin{cases} y = \alpha x - 4\alpha + 3 \\ (\alpha^2 + 1)x^2 - (8\alpha^2 + 12\alpha + 26)x + 16\alpha^2 + 48\alpha + 169 = 0 \end{cases}$$

Développons la seconde équation du système précédent. Commençons par développer le second carré, avec la triple distributivité :

$$\begin{aligned}
 & (\alpha x - 4\alpha - 6)^2 \\
 &= (\alpha x - 4\alpha - 6) \times (\alpha x - 4\alpha - 6) \\
 &= \alpha^2 x^2 - 4\alpha^2 x - 6\alpha x - 4\alpha^2 x + 16\alpha^2 + 24\alpha - 6\alpha x + 24\alpha + 36 \\
 &= \alpha^2 x^2 + (-4\alpha^2 - 6\alpha - 4\alpha^2 - 6\alpha) x + 16\alpha^2 + 24\alpha + 24\alpha + 36 \\
 &= \alpha^2 x^2 + (-8\alpha^2 - 12\alpha) x + 16\alpha^2 + 48\alpha + 36
 \end{aligned}$$

Nous pouvons maintenant développer la seconde équation du système de la question précédente.

$$\begin{aligned}
 (x - 13)^2 + (\alpha x - 4\alpha - 6)^2 &= 36 \\
 x^2 - 26x + 13^2 + \alpha^2 x^2 + (-8\alpha^2 - 12\alpha) x + 16\alpha^2 + 48\alpha + 36 &= 36 \\
 (\alpha^2 + 1) x^2 + (-8\alpha^2 - 12\alpha - 26) x + 16\alpha^2 + 48\alpha + 36 + 169 - 36 &= 0 \\
 (\alpha^2 + 1) x^2 - (8\alpha^2 + 12\alpha + 26) x + 16\alpha^2 + 48\alpha + 169 &= 0
 \end{aligned}$$

Puisque les solutions de la seconde équation correspondent aux valeurs possible de x (abscisse des points d'intersection de \mathcal{C} et \mathcal{D}), et que pour chaque abscisse il n'y a qu'une ordonnée correspondante (d'après la première équation), alors le nombre de solutions de la seconde équation correspond au nombre de points d'intersection entre \mathcal{C} et \mathcal{D} .

On calcule le discriminant de l'expression précédente, soit :

$$\Delta = (8\alpha^2 + 12\alpha + 26)^2 - 4 \times (\alpha^2 + 1) \times (16\alpha^2 + 48\alpha + 169)$$

Pour éviter les erreurs de calculs, on fait développer cette expression par le logiciel de calcul formel Xcas¹.

$\text{developper}((8\alpha^2 + 12\alpha + 26)^2 - 4 * (\alpha^2 + 1) * (16\alpha^2 + 48\alpha + 169))$
$-180 * \alpha^2 + 432 * \alpha$

1. C'est un logiciel libre et gratuit, que vous pouvez télécharger et installer gratuitement et légalement sur GNU/Linux, Windows et MacOS : <https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html>.

4. Dresser, en fonction de α , le tableau de signes de l'expression $-180\alpha^2 + 432\alpha$.

Cette expression est un trinôme du second degré, avec $a = -180$, $b = 432$, $c = 0$. Son discriminant est $\Delta' = b^2 - 4ac = 432^2 - 4 \times (-180) \times 0 = 432^2$. Le discriminant est positif, donc il y a deux racines :

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta'}}{2a} = \frac{-432 - \sqrt{432^2}}{2 \times (-180)} = 0 \\ \alpha_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta'}}{2a} = \frac{-432 + \sqrt{432^2}}{2 \times (-180)} = -2, 4\end{aligned}$$

Nous pouvons maintenant tracer le tableau de signes.

α	$-\infty$	$-2, 4$	0	$+\infty$	
Δ	$-$	0	$+$	0	$-$

5. En déduire, en fonction de α , le nombre de solutions du système de la question 3, puis le nombre de points d'intersection entre \mathcal{C} et \mathcal{D} .

Le nombre de solutions du système 3 est le même que le nombre de points d'intersections entre le cercle \mathcal{C} et la droite \mathcal{D} . Donc :

- si $\alpha \in]-\infty; -2, 4[\cup]-\infty; 0[$, alors Δ est strictement négatif, le système n'a pas de solutions, et la droite et le cercle n'ont aucun point d'intersection ;
- si $\alpha = 0$ ou $\alpha = -2, 4$, alors Δ est nul, le système a une seule solution, et la droite et le cercle ont un unique point d'intersection (la droite est alors tangente au cercle) ;
- si $\alpha \in]-2, 4; 0[$, alors Δ est strictement positif, le système a deux solutions, et la droite et le cercle ont deux points d'intersection (la droite « traverse » le cercle).