Exercice 1 (Variables aléatoires)**.** *Exercices 2 et 3 du DM °6.* Voir le corrigé du DM.

Exercice 2 (Inéquation)**.** *L'objet de l'exercice est de résoudre l'inéquation suivante.*

$$2x^3 - 4x^2 - 10x - 24 \geqslant 0$$

C'est une inéquation du troisième degré, sans factorisation évidente, donc nous ne connaissons pas de méthode générale pour la résoudre.
On pose $f : x \mapsto 2x^3 - 4x^2 - 10x - 24$.

1. *En utilisant la dérivée, montrez que le tableau de variations de f est le suivant.*
   Commençons par dériver la fonction f.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^3 - 4x^2 - 10x - 24 \\ f'(x) &= 2 \times 3x^2 - 4 \times 2x - 10 \\ &= 6x^2 - 8x - 10 \end{aligned}$$

   Donc f' est un polynôme du second degré de discriminant $\Delta = (-8)^2 - 4 \times 6 \times (-10) = 304$. Il est positif, donc il y a deux solutions :

$$\begin{aligned} x_1 &= \tfrac{-(-8)-\sqrt{304}}{2\times6} = \tfrac{8-4\sqrt{19}}{12} = \tfrac{2-\sqrt{19}}{3} \\ x_2 &= \tfrac{-(-8)+\sqrt{304}}{2\times6} = \tfrac{8+4\sqrt{19}}{12} = \tfrac{2+\sqrt{19}}{3} \end{aligned}$$

   Nous pouvons donc tracer le tableau de signes de f', et en déduire le tableau des variations.

x	$-\infty$		$\frac{2-\sqrt{19}}{3}$		$\frac{2+\sqrt{19}}{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	-19,6	$\searrow$	-44,1	$\nearrow$	

2. *Complétez, sur le tableau précédent, les valeurs approchées des extremums de f (avec une précision qui vous semble pertinente).*
   Nous avons calculé $f\left(\frac{2-\sqrt{19}}{3}\right) \approx -19,6$, et $f\left(\frac{2+\sqrt{19}}{3}\right) \approx -44,1$, et reporté les données sur le tableau de variations de la question précédente.
3. *Calculez $f(4)$.*

$$f(4) = 2 \times 4^3 - 4 \times 4^2 - 10 \times 4 - 24 = 0$$

4. *En déduire les solutions de l'inéquation.*
   D'une part, sur l'intervalle $\left]-\infty; \frac{2+\sqrt{19}}{3}\right]$, le maximum de la fonction f est $-19,6$ environ, donc l'inéquation $f(x) \geqslant 0$ n'a pas de solutions.

D'autre part, sur l'intervalle $\left[\frac{2+\sqrt{19}}{3};+\infty\right[$, la fonction f est strictement croissante, et passe par 0 en $x=4$. Donc sur cet intervalle (et sur l'ensemble des réels), les solutions de $f(x)\geqslant 0$ sont $\boxed{x\geqslant 4}$.

Exercice 3 (Optimisation)**.** *On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f par $f(x)=\frac{1+x}{1+x^2}$. L'objet de l'exercice est de déterminer ses extremums.*

1. *Montrez que pour tout x de son domaine de définition, on a :*

$$f'(x)=\frac{-x^2-2x+1}{\left(1+x^2\right)^2}$$

La fonction f est de la forme $f(x)=\frac{u(x)}{v(x)}$, avec :

$$\begin{array}{ll} u(x)=1+x & v(x)=1+x^2 \\ u'(x)=1 & v'(x)=2x \end{array}$$

Nous calculons donc sa dérivée avec la formule $\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1\times(1+x^2)-2x\times(1+x)}{\left(1+x^2\right)^2} \\ &= \frac{1+x^2-2x-2x^2}{\left(1+x^2\right)^2} \\ &= \frac{-x^2-2x+1}{\left(1+x^2\right)^2} \end{aligned}$$

2. *Recopiez et complétez le tableau de signes suivant, en justifiant.*

D'une part, le numérateur $-x^2-2x+1$ est un polynôme de second degré, de discriminant $\Delta=(-2)^2-4\times(-1)\times 1=8$, et de racines $x_1=\frac{-(-2)-\sqrt{8}}{2\times(-1)}=-1+\sqrt{2}$ et $x_1=\frac{-(-2)+\sqrt{8}}{2\times(-1)}=-1-\sqrt{2}$.

D'autre part, le dénominateur $\left(1+x^2\right)^2$ est un carré, donc il est toujours strictement positif.

x	$-\infty$		$-1-\sqrt{2}$		$-1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$-x^2-2x+1$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$\left(1+x^2\right)^2$		$+$		$+$		$+$	
$f'(x)=\frac{x^2+2x-1}{(1+x^2)^2}$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		$\searrow$	-0,2	$\nearrow$	1,2	$\searrow$	

3. *En déduire le tableau de variations de f (n'oubliez pas de calculer la valeur des extremums, arrondies au dixième).*
   Fait dans la question précédente.
4. *Donnez les extremums de f, en précisant pour quelles valeurs de x ils sont atteints, ainsi que s'il s'agit d'extremums locaux ou globaux.*
   Le nombre 1,2 est un maximum local de f, atteint en $x=-1+\sqrt{2}$. Le nombre 0,2 est un minimum local de f, atteint en $x=-1-\sqrt{2}$.
   Nous ne savons pas si ces extremums sont des extremums globaux ou pas, car nous ne connaissons pas le comportement de f en $-\infty$ et $+\infty$ (vous verrez cela l'an prochain).